






nutristar

STAR LIVER P



Mejora del rendimiento zootecnic



*Hassan et al., 2005
Test on 405 heavy broilers*

- **Crecimiento +3,2% con colina, +4,8% con betaina**
- **Mejor eficiencia alimenticia: 2,96 vs 3,06 con colina, 2,98 vs 3,11 con betaina.**





STAR LIVER P es una mezcla de colina y betaina=efecto sinérgico.

Mejora la postura


Prueba de campo en aves de postura de la semana 18 a la

42



Uso del Star Liver P durante 5 días a 18, 24, 30 y 36 semanas.

Prueba de campo al final de la postura (base 100 = IC del lote de ponedoras sin STARLIVER P)



2 SEMANAS DESPUES DE LA ADMINISRACION DEL PRODUCTO, SE NOTA UNA MEJORA DEL INDICE DE CONVERSION DE LAS GALLINAS. DE FORMA GENERAL, SOBRE LAS 10 SEMANAS DE PRUEBA, NOTAMOS UNA REDUCCION DEL 6% DEL INDICE CORPORAL GRACIAS AL USO DE STAR LIVER P.

Posicionamiento STAR LIVER P

- **Aves de engorda:**
 - 2kg/t en el alimento completo durante 1 semana o en casos de estrés térmico o caída del consumo
- **Aves de postura**
 - 2 kg/t de alimento durante 1 semana, repetir cada 4-5 semanas.